
vol. 1, nº 1 avril 2001

Revue
du GOPA
Groupe
Ornithologique
des Pyrénées
et de l'Adour



Robert Hainank

Suivi d'un couple de Gypaètes barbus : notes de terrain

Les comptages hivernaux des oiseaux d'eau en Béarn depuis 1996

Synthèse des observations du 1er novembre 1999 au 31 octobre 2000

Nidification exceptionnelle de l'Hirondelle rousseline en Béarn Dimorphisme sexuel chez l'Élanion blanc Nidification du Faucon pèlerin sur la côte atlantique Nidification du Blongios nain en Béarn Observations rares

Observation du Phalarope à bec étroit *Phalaropus lobatus* en Béarn (Pyrénées-Atlantiques)

André NERRIÈRE

Le Phalarope à bec étroit (ou à bec mince) est le plus petit du genre *Phalaropus*. Cet oiseau, de la famille des Limicoles, niche communément en Scandinavie et en Islande. La migration post-nuptiale (août-septembre), orientée vers le sud-est, va le conduire sur ses zones d'hivemage situées dans le Golfe Persique et l'Océan Indien.

Ce 25 septembre 2000 il fait encore chaud à 18 heures sur les rives du lac de l'Ayguelongue (communes de Momas et Mazerolles-64). Cette retenue, érigée en 1996 pour les besoins de l'agriculture, attire chaque année de nombreux migrateurs qui y font escale avant de franchir les Pyrénées par les vallées béamaises ou souletines.

Alors que A. Guyot et mei-même observons Chevaliers et Bécasseaux à la recherche de nourriture, notre attention est attirée par un point brillant se déplaçant entre trois Grèbes huppés *Podiceps cristatus* au centre du lac. Après nous être rapprochés, nous avons la surprise de découvrir un Phalarope dans nos télescopes. Un examen attentif de l'oiseau nous permet d'apercevoir distinctement le long bec fin : il s'agit d'un Phalarope à bec étroit *Phalaropus lobatus* en plumage juvénile. Il n'a pas été retrouvé les jours suivants.

Cette observation est particulièrement intéressante car elle constitue la première mention de l'espèce en Béarn. Ce Phalarope est très rare dans le Sud-Ouest de la France et n'est pas observé chaque année. Les données les plus récentes (provenant toutes du littoral aquitain ou de ses proches environs) que nous avons pu réunir se comptent sur les doigts d'une main :

- 1 le 20/11/1990 à Capbreton-40 (G. Blake) ^(S)
- 1 le 27/09/1991 à Capbreton-40 (J.L. Grangé) ⁽²⁾
- 1 le 26/09/1993 à St-Pée-sur-Nivelle-64 (P. Boudarel) (4).
- 1 le 13/08/1999 au Parc omithologique du Teich-33 (A. Fleury) ⁽⁶⁾
- 1 jeune le 15/10/2000 dans la baie de Txingudi, Hendaye-64 (L. Gonzalez).

L'observation du 20 novembre dans les Landes paraît très tardive (bien qu'il y ait eu récemment un hivemage dans le marais de Guérande-44) (3), alors que les autres rentrent tout à fait dans le « pattern » d'apparition de l'espèce en France. De l'autre côté des Pyrénées, l'espèce a le même statut en Navarre : seulement trois observations depuis 1992, la demière datant du 12/08/1998 sur la Lagune de Pitillas (1).

Bibliographie

- (1) DEVESA J.M., NARZABAL E., 2000. Anuario ornitologico de Navarra. Vol. 5 (1998), pp. 71-72.
- (2) GRANGÉ J.L., GUYOT A., 1993. Inventaire des espèces rares ou occasionnelles observées dans le sud-ouest de l'Aquitaine ces demières années. La Bergeronnette, 15 : 11-15.
- (3) **LEGRAND P.-R., 1999.** Le coin des branchés. L'Oiseau magazine, 54 : 66 ; 55 : 72.
- (4) Feuille de liaison L.N.A. n° 30 (4ème trimestre 1993).
- (5) Fiche de liaison C.R.O.A.P. nº 12 (1er trimestre 1991).
- (6) LPO Aquitaine infos nº 18 (septembre 1999), p.11.

Summary: Record of the Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus in the Béarn (Pyrénées-Atlantiques). On 25th September 2000, a young Red-necked Phalarope was seen on a lake in the Béarn (Pyrénées-Atlantiques). This is the first record for this part of the department. Earlier records for the Aquitaine region are mentioned.

André Nerrière, Clos Henri IV, rue Vincent AURIOL, 64000 PAU