


D'OS

Revue  
du **GOPA**  
Groupe  
Ornithologique  
des Pyrénées  
et de l'Adour

vol. 1, n° 1 avril 2001



*Robert Hainard*

LE CASSEUR

Suivi d'un couple de Gypaètes barbus : notes de terrain

Les comptages hivernaux des oiseaux d'eau en Béarn depuis 1996

Synthèse des observations du 1er novembre 1999 au 31 octobre 2000

Nidification exceptionnelle de l'Hirondelle rousseline en Béarn

Dimorphisme sexuel chez l'Élanion blanc

Nidification du Faucon pèlerin sur la côte atlantique


Nidification du Blongios nain en Béarn

Observations rares

**Nidification exceptionnelle de  
l'Hirondelle rousseline *Hirundo daurica*  
dans les Pyrénées-Atlantiques**

**Maurice WATERHOUSE**

Nous avons reçu le manuscrit suivant par l'intermédiaire de Richard Cruse, que nous remercions vivement. Il nous a paru utile de le publier tel quel, suivi de quelques commentaires sur cet événement inédit. Un résumé en Français permettra à nos lecteurs qui ne seraient pas familiarisés avec la langue de Shakespeare de comprendre l'essentiel du propos de M. Waterhouse.



*Recorder : M. Waterhouse, 30 Beswick Close, Cheadle, Stoke-on-Trent, England. ST10 1LE*

*Date of sighting : 25th July 1998*

*Place : in the region of Arros-d'Oloron*



**Sighting :** Whilst driving along the N 134, going from Oloron towards the col du Somport, I saw a swallow with a rather slow flight pattern fly across the road. Having seen many Red-rumped swallows in Bulgaria, as well as in the clock tower in Jaca<sup>(1)</sup>, I recognised the bird as a Red-rumped swallow and stopped to investigate. The lack of any red under the throat, rather dirty underparts, reddish nape and reddish rump confirmed my sighting.

The bird was seen to enter a small semi-derelict building in a field on the left hand side of the road (eastern side). Further investigation revealed a typical Red-rumped swallow nest with its pipe entry, and the bird was obviously feeding young. It would not enter the building whilst I was inside but as soon as I retreated it entered immediately. I watched it for about 15 minutes, never seeing more than one bird, and it came and went at least five times.

When the site was investigated in 1999 I found that the building had been renovated and there was no sign of the swallows.

**Note de la Rédaction :** Les plus proches zones de reproduction connues de l'Hirondelle rousseline (espèce à affinité méditerranéenne) se situent dans le sud de l'Aragon et le sud-est de la France (quelques dizaines de couples). Une reproduction possible a été signalée sur le littoral Aquitain (Lacanau, Gironde) en 1983 (M. Clément, 1985 : Observation d'Hirondelles rousselines *Hirundo daurica*. *Le Courbageot*, 11 : 52.).

Pour le bassin de l'Adour, hormis la nidification relatée ici, nous ne connaissons que trois données :

- 1 le 4/04/1990 à Tarnos-40 (J.L. Grangé)
- 1 le 14/05/1998 au domaine d'Abbadia, Hendaye-64 (A. Larousse)
- 1 dans un vol d'Hirondelles rustiques *Hirundo rustica* le 13/08/2000 en haute vallée de Roncal (Espagne), provenant du versant français (R. Cruse).

L'espèce est notée régulièrement (1-2 individus) au printemps à la Pointe-de-Grave (Gironde), à l'occasion du suivi de la migration pré-nuptiale. Il est probable que cette hirondelle soit plus régulière qu'il n'y paraît dans notre région, tout particulièrement sur le littoral, où les anciens blockhaus pourraient abriter sa nidification. Des prospections printanières ou estivales de ces milieux seraient donc souhaitables, de même qu'une plus grande attention portée aux vols d'Hirondelles rustiques.

**Résumé :** Le 25 juillet 1998, M. Waterhouse observe une Hirondelle rousseline en vol au bord de la route d'Oloron, à Asasp-Arros. Cet oiseau pénètre à plusieurs reprises dans une grange à l'abandon. Un nid typique de l'espèce est alors découvert dans ce bâtiment. Dès que l'observateur en fut ressorti, l'hirondelle rentra de nouveau dans la grange. En 15 minutes, au moins 5 va-et-vient furent ainsi observés, ce qui indique probablement la présence de jeunes au nid. Un seul adulte fut observé.

L'année suivante le site fut de nouveau visité, mais le bâtiment avait été rénové et les oiseaux étaient absents.

<sup>(1)</sup> NDLR : La présence de l'espèce à Jaca n'est pas signalée par nos collègues aragonais, aussi mérite-t-elle confirmation