



Première observation d'un mâle de Traquet oreillard *Oenanthe hispanica* dans les Hautes-Pyrénées, France

Olivier GROSSELET et Méлина VAUCHÉ

L'aire de distribution du Traquet oreillard *Oenanthe hispanica* est nord méditerranéenne. Elle est occupée par deux sous-espèces : *O. h. hispanica* répartie de la pointe nord-ouest du Maroc, en passant par la péninsule ibérique jusqu'au nord-ouest des Balkans et *O. h. melanoleuca* du sud de l'Italie, en passant par le sud des Balkans jusqu'au Moyen-Orient, atteignant l'Iran (Clement & Vatev, 1997). Ce traquet est considéré comme un oiseau de la zone climatique chaude méditerranéenne (*ibidem*). En France, il est nicheur sur le pourtour méditerranéen, dont les Pyrénées-Orientales et l'Aude et est connu en montagne de 600 à 2800 m. (Prodon & Isenmann, 1994). Dans la région Midi-Pyrénées, il est connu comme nicheur sur les Causses Noir et du Larzac (Bousquet, 1997). Le 09 mai 1999, Raymond et Lamothe (2002) observaient un mâle dans les Pyrénées-Atlantiques, à 1200 m. d'altitude, aux environs du col d'Anostéguy, commune de Saint-Michel. Elle constituait la seule donnée détaillée de cette espèce dans les Pyrénées occidentales (Grangé, 2002).

Nous apportons une première observation, à notre connaissance, dans les Hautes-Pyrénées avec un mâle contacté visuellement le 30 avril 2003, au dessus de Gavarnie à 1670 m. d'altitude, près de la cascade du Terrail au-dessus de la rive droite du ruisseau de Holle. Aux alentours de 13h00, par un temps dégagé et ensoleillé, nous avons eu quelques minutes pour identifier cet individu, à une distance de vingt mètres environ. La gorge était bien blanche, la bande noire parotique et loréale fine, apposée de part et d'autre de l'œil. Le haut du dos, la nuque et la couronne étaient très faiblement rouille. Sur la base du critère de l'interruption de la bande sourcilière par l'œil, la sous-espèce probable est *O. h. hispanica* (Svensson, 1992). Cette probabilité est confortée par la position géographique de l'observation. Le milieu constitué d'une pelouse rase parsemée de roches apparentes et de Genévriers nains *Juniperus communis nana* (Willd.) est propice à son installation. Même si la date laisse supposer que nous avons à faire à un migrateur pré-nuptial, il serait intéressant de retourner sur le site pour contrôler une éventuelle nidification de l'espèce. Le réchauffement climatique lui sera-t-il favorable ?

Summary: A male Black-eared Wheatear *Oenanthe hispanica*, was seen near Gavarnie, in open grassland with juniper at an altitude of 1670 metres on 30 April, 2003. This is the first record for the species for the department of the Hautes-Pyrénées. The bird's features and its geographical position suggest it was *O. h. hispanica*. Could a breeding population exist in the area?

Resumen : Una primera observación de un macho de Collalba rubia *Oenanthe hispanica* se describe en Hautes-Pyrénées. Fue observado el 30 de abril de 2003, cerca de Gavarnie, en un pastizal corto de Pinos enanos, a una altitud de 1670 metros sobre el nivel del mar. Se determina *O. h. hispanica* por el plumaje y la ubicación. Podría anidar en esta localidad ?

Remerciements

Nos vifs remerciements à Manuel Grosselet pour sa traduction du résumé en espagnol.

Bibliographie

- BOUSQUET J.-F., 1997. Traquet oreillard *Oenanthe hispanica*, in JOACHIM J., BOUSQUET J.-F. & FAURE C. – *Atlas des oiseaux nicheurs de Midi-Pyrénées. Années 1985 à 1989*. AROMP, Toulouse. 262 p.
- CLEMENT P. & VATEV I., 1997. *Oenanthe hispanica* Black-eared Wheatear, in HAGEMEIJER W.J.M & BLAIR M.J. (eds.) – *The E.B.C.C. Atlas of European Breeding Birds. Their Distribution and Abundance*. T & A.D. Poyser, London. 903 p.
- GRANGE J.-L., 2002. Liste commentée des oiseaux des Pyrénées occidentales et du sud des Landes. *Le Casseur d'os*, 2 (2) : 84-132.
- PRODON R. & ISENMANN P., 1994. Traquet oreillard *Oenanthe hispanica*, in YEATMAN-BERTHELOT D. & JARRY G. – *Nouvel atlas des oiseaux nicheurs de France. 1985-1989*. Société Ornithologique de France, Paris. 776 p.
- RAYMOND C. & LAMOTHE B., 2002. Première observation circonstanciée du Traquet oreillard *Oenanthe hispanica* dans le département des Pyrénées-Atlantiques. *Le Casseur d'os*, 2 (1) : 67.
- SVENSSON L., 1992. *Identification guide to European passerines*. Published by the author, Stockholm. Pp. 133-135.

Olivier Grosselet et Mélina Vauché
ISSNS-Philofauna
11 rue Foch
44240 La Chapelle-sur-Erdre

Note de la rédaction : les deux formes *O. hispanica* et *O. melanoleuca* sont considérées aujourd'hui comme deux espèces « vraies » par la plupart des ornithologues (ULLMAN M., 2003. Separation of Western and Eastern Black-eared Wheatear. *Dutch Birding* vol. 25 (2) : 77-97, auquel on se reportera pour la distinction morphologique de ces deux taxons).