

Revue
du **GOPA**
Groupe
Ornithologique
des Pyrénées
et de l'Adour

vol. 2, n° 1

Avril 2002



Robert Hainard

LE CASSEUR

Erratisme du Vautour fauve et du Vautour percnoptère en Béarn
Résultats de la campagne de prospection de la Chouette de Tengmalm
Synthèse des observations du 1er novembre 2000 au 31 octobre 2001

A la recherche du Pouillot ibérique

Observations rares

Première observation d'un Bécasseau à queue pointue

Calidris acuminata en Aquitaine, sur le lac de l'Ayguelongue

Andréas GUYOT

Le Bécasseau à queue pointue est un des plus rares limicoles observables en France. Il est occasionnel en Europe occidentale, essentiellement en mai et juillet-septembre. Sa distribution est très orientale, l'oiseau nichant au nord-est de la Sibérie et hivernant surtout en Australie et Nouvelle-Zélande via la Chine, les Philippines et l'Indonésie (Hayman et al. 1986).

Pendant 10 jours, du 16 au 25 septembre 2001, nous avons eu la chance d'observer un individu adulte de cette espèce sur le lac de l'Ayguelongue (Momas, Pyrénées-Atlantiques). Le dimanche 16 septembre en soirée (aux environs de 17 h), je vis parmi les divers bécasseaux présents sur ce site un gros *Calidris* au bec court. Je flashe immédiatement, n'ayant jamais vu un tel limicole. Les critères relevés permettent bientôt d'identifier un Bécasseau à queue pointue. L'oiseau sera observé par de nombreuses personnes jusqu'au 25 septembre.

Description de l'oiseau

Parties nues : pattes verdâtres (bien éclairées au soleil elles paraissent chair foncée), petit bec courbé aussi long que la tête, plus clair à la base.

Silhouette et taille : plus grand que le Bécasseau variable *C. alpina*, plus rond que le Bécasseau cocorli *C. ferruginea* ; lorsque l'oiseau se toilette, la queue est nettement pointue. Le cou court et la petite tête lui donnent une allure particulière lorsqu'il se nourrit penché en avant.

Tête : cercle orbital blanc, sourcil très marqué en arrière de l'œil et descendant sur la base du bec où subsiste une légère barre noire, joue claire, calotte rousse rayée de noir ressortant bien par rapport au cou.


Corps : plumes du dos sombres frangées de clair, les liserés clairs des plumes laissant croire à deux « V » blancs sur le dos ; cou assez marqué de teinte marron / roux, rayé de sombre ; les taches de la poitrine sont des petits chevrons qui se prolongent sur les flancs (sous la ligne d'aile jusque sur les sous-caudales) ; plumes rayées (deux rangées de barres) sur les sous-caudales ; côté des rectrices pâles (les rectrices sont aussi longues que les primaires) ; fine barre alaire en vol.

Cris : l'oiseau était silencieux ; au décollage nous avons entendu un « thir, trip, tri ».

Comparé à un Chevalier sylvain *Tringa glareola* voisin, le Bécasseau à queue pointue a un œil plus petit même s'il a un cercle orbital blanc ; il est moins haut sur pattes, moins élancé, plus rond ; bref, les deux oiseaux n'ont rien à voir pour un ornithologue habitué.

Discussion

En France, la première donnée de ce bécasseau vient d'un oiseau tué le 18 septembre 1972 en baie de l'Aiguillon, Vendée (Dubois et Yésou 1991). Le premier individu observé vivant est un adulte présent en Camargue, Bouches-du-Rhône, du 10 au 27 avril 1999 (Dubois et al. 2000). En 2000, une nouvelle observation de l'espèce a lieu sur la gravière de Desnes, Jura, avec un adulte en plumage nuptial présent du 11 au 14 juillet (Coin des Branchés, *L'Oiseau Magazine*). Notre observation constitue donc la quatrième pour la France et la première en Aquitaine. L'année 2001 a vu aussi un oiseau à Sorve





(Estonie) le 31 août et un autre à Apfufero (Espagne) les 1 et 2 septembre.

Ailleurs en Europe, on connaît 26 observations en Grande-Bretagne de 1938 à 2000, 3 aux Pays-Bas, 1 en Belgique, 2 au Danemark, 1 en Finlande, 4 en Norvège, 4 en Suède, 1 en Autriche (Mitchell *et al.* 1997). Ces dernières années ont vu, tant en France qu'ailleurs en Europe, une augmentation de la fréquence d'apparition du Bécasseau à queue pointue. Cela est-il dû à une meilleure connaissance de l'espèce grâce à l'édition de nouveaux guides ou revues d'identification, ou bien à un réel phénomène sur le terrain ? La question demeure. L'oiseau occupe les mêmes zones de nidification que le Bécasseau tacheté *C. melanotos*, ce dernier hivernant principalement en Amérique du Sud (Hayman *et al. op. cit.*). Quelques individus suivraient-ils cette dernière espèce ? Franchiraient-ils alors le détroit de Béring, puis le Canada, le Groënland, etc ? Ce qui est certain c'est que l'oiseau est régulier dans l'Ouest du Canada, plus rare mais annuel sur la côte ouest de l'Amérique du Nord où il s'agit surtout de juvéniles (Sibley 2000). Une autre hypothèse est que ces oiseaux suivraient plus classiquement les voies migratoires des Bécasseaux minute *C. minuta*, cocorli *C. ferruginea* et variable *C. alpina*. Ceci expliquerait que l'espèce soit plus fréquente en Grande-Bretagne (Dymond *et al.* 1989), surtout entre août et octobre (Alström *et al.* 1992), ainsi qu'en Norvège et Suède (Mitchell *et al. op. cit.*). On peut s'interroger sur les chances de notre oiseau à retrouver son aire de nidification sibérienne, qu'il ait atteint les Pyrénées-Atlantiques en passant par le détroit de Béring ou bien par la Scandinavie.

Summary : First record of a Sharp-tailed Sandpiper *Calidris acuminata* in Aquitaine, on the Ayguelongue lake.

The Sharp-tailed Sandpiper is one of the rarest waders to be seen in France (3 previous records in 1972, 1999 et 2000). An adult of this species was present on the Ayguelongue lake (Momas, Pyrénées Atlantiques) from 16-25 September 2001. This bird is described in detail and the world and european status of the species is discussed.

Resumen : Primera observacion en Aquitania de un Correlimos acuminado *Calidris acuminata* en el lago del Ayguelongue.

El Correlimos acuminado es uno de los limícolas más raros que pueden verse en Francia (3 datos anteriores, en 1972, 1999 y 2000). Un adulto de esta especie fue visto en el lago del Ayguelongue (Momas, Pirineos-Atlánticos) del 16 al 25 de septiembre del 2001. El ave observada es aquí descrita con detalle ; son presentados también los estados mundial y europeo de la especie.

Bibliographie

ALSTRÖM P., COLSTON P., LEWINGTON I., 1992. *Guide des oiseaux accidentels et rares en Europe*. Delachaux et Niestlé, Paris, p. 124.

DUBOIS P.J., YÉSOU P., 1991. *Les oiseaux rares en France*. Chabaud, Bayonne, 364 p.

DUBOIS P.J., LE MARÉCHAL P., OLIOSO G., YÉSOU P., 2000. *Inventaire des Oiseaux de France*. Nathan, Paris, p. 159.

DYMOND J.N., FRASER P.A., GANTLETT S.J.M., 1989. *Rare birds in Britain and Ireland*. Calton, 366 p.

HAYMAN P., MARCHAN J., PRATER, 1986. *Shorebirds. An identification guide to the waders of the world*. Beckenham, 412 p.

MITCHELL *et al.*, 1997. *Photographic handbook of the rare birds of Britain and Europe*. New Holland Ltd., 176 p.

SIBLEY D., 2000. *The North American Bird Guide*. Pica Press U.K., 544 p.

Remerciements : Je remercie tous les membres du GOPA pour être venus confirmer mon observation, les photographes, Jean-Louis-Grangé pour ses recherches bibliographiques et son aide dans l'élaboration de cette note, et enfin Stéphane Duchâteau pour son travail de frappe.

Andréas Guyot, 7, rue Jules Verne, 64000 PAU

Première observation d'un Bécasseau à queue pointue *Calidris acuminata*... Andréas Guyot