

Revue
du **GOPA**
Groupe
Ornithologique
des Pyrénées
et de l'Adour

vol. 2, n° 1

Avril 2002



Robert Hainard

LE CASSEUR

Erratisme du Vautour fauve et du Vautour percnoptère en Béarn
Résultats de la campagne de prospection de la Chouette de Tengmalm
Synthèse des observations du 1er novembre 2000 au 31 octobre 2001

A la recherche du Pouillot ibérique

Observations rares

À la recherche du Pouillot ibérique *Phylloscopus brehmii*

Éric LAPOUS

Ayant programmé six jours de vacances en Aquitaine du 1er au 6 mai 2001, j'ai axé un peu mes périples sur la recherche du Pouillot ibérique *Phylloscopus brehmii* dans le Pays Basque. Avant de partir je me plongeai dans ma bibliothèque afin d'en savoir plus sur cette espèce. Dans le *Nouvel Atlas des Oiseaux Nicheurs de France*, le texte de Marc Salomon m'éclaire un peu plus :

« La forme ibérique est répartie depuis les montagnes du nord du Portugal (à partir de la Serra da Estrêla), à travers tous les Monts Cantabriques et la plaine au nord de cette chaîne bordant l'océan atlantique, jusqu'aux Pyrénées occidentales et l'Adour...

En France, la limite septentrionale et orientale commence, sur la façade atlantique, par l'Adour. Elle se continue par une ligne passant grosso modo par Urt, le bois de Mixe, Saint-Palais, le col d'Osquich, la forêt des Arbailles et le versant occidental de la forêt d'Iraty...

Les Pouillots véloces ibériques se rencontrent en grande densité (5 à 8 couples pour 10 ha) dans les massifs boisés du Pays Basque occidental : forêt d'Ustaritz, de Biriadou, de Saint-Pée-sur-Nivelle, bas des pentes de La Rhune. Ils deviennent plus rares, voire inexistantes dans les milieux enrésinés ou à plus de 600 m d'altitude (forêt d'Orion), où ne se trouve presque exclusivement que la forme collybita. La densité est moyenne (2-3 couples pour 10 ha) dans les aires à bois morcelés (régions d'Ustaritz, de Louhossoa, de Saint-Étienne-de-Baïgorry, Pays de Quint)...

Les premiers *Brehmii* n'arrivent qu'au cours de la première semaine d'avril. »

Ayant commandé auprès de mon ami Andréas Guyot *Le Casseur d'os* vol. 1. n°1, ma surprise fut grande de ne voir apparaître aucune mention de ce pouillot dans la synthèse ornithologique du 1er novembre 1999 au 31 octobre 2000. Un autre ami, Jean-François Darras, l'avait recherché sans succès après la mi-avril 2001 dans la région d'Ustaritz. Le doute germa dans mon esprit : l'espèce était-elle bien recherchée par les ornithologues ou était-ce une « rareté locale » ? Je penchais fortement pour la deuxième version.

Andréas m'avait signalé la présence de quelques chanteurs après Mendive, en direction de la fontaine d'Ahusquy (environs du lieu-dit Ouristary). Il n'avait par contre contacté aucun oiseau dans la zone partant de Saint-Jean-Pied-de-Port et sui-



vant la D 918, ainsi que la Nive, jusqu'à Saint-Martin-d'Arossa et Bidarray (le Pouillot ibérique avait déjà été signalé dans ce secteur).

Synthèse de mes prospections et observations du 1er au 6 mai

Il faut signaler que les deux premiers jours de mon voyage ont été très corrects sur le plan de la météo ; ensuite un temps très pluvieux s'est installé sur le département, ne favorisant pas une prospection des plus idéales (activité de chant moins intense).

1er mai

Après Mendive et Ascarat : uniquement du Pouillot véloce.

2 mai

Ascarat : depuis le mobil-home situé dans le camping de Narbaïtz, j'entends un chanteur de *Brehmii* à 7h30. Malheureusement à ma sortie l'oiseau ne chante plus et malgré d'intenses recherches dans tout le camping le pouillot reste introuvable ! Était-il en migration ?

Forêt d'Ustaritz : à la fin de la forêt (proche de la forêt de Saint-Pée-sur-Nivelle) je découvre près d'un secteur de palombières trois Véloces et un Ibérique.

Col d'Osquich et Lanne-en-Barétous : R.A.S.

3 mai

Après Mendive et secteur des chalets d'Iraty : R.A.S.

4 mai

Environs d'Ascarat (village, table d'orientation...) et d'Estérençuby : uniquement du Véloce.

5 mai

Saint-Étienne-de-Baïgorry (bois morcelés en suivant le GR) : uniquement du Véloce.

6 mai

Forêt de Saint-Pée-sur-Nivelle : uniquement du Véloce.

Forêt d'Ustaritz : je recadrille la zone prospectée le 2 mai ; absence de *Brehmii*, présence uniquement de Pouillots véloces.

Ma prospection concernant le Pouillot ibérique au Pays-Basque ne me permet pas de tirer de conclusions mais m'amène plutôt à des interrogations :

La détermination de cette espèce est certes plus délicate, mais son chant étant caractéristique, je doute qu'elle passe inaperçue auprès des ornithologues atten-

À la recherche du Pouillot ibérique *Phylloscopus brehmii* ... Éric Lapous

tifs. Cet oiseau est-il aussi « abondant » que le signale la littérature consultée ?

Y a-t-il des années où une quantité plus importante d'oiseaux en provenance d'Espagne et du Portugal remontent vers les Pyrénées-Atlantiques ?

Bibliographie consultée

DUBOIS P.J., LE MARÉCHAL P., OLIOSO G., YÉSOU P., 2000. *Inventaire des Oiseaux de France. Avifaune de France métropolitaine*. Nathan, Paris, p. 309.

LE MARÉCHAL P. et la C.A.F., 1998. En direct de la C.A.F. *Ornithos*, 5 (1) : 39-40.

SALOMON M., 1995. Pouillot véloce ibérique *Phylloscopus collybita brehmii* in YEATMAN-BERTHELOT D. et JARRY G. *Nouvel Atlas des Oiseaux Nicheurs de France, 1985-1989*. S.O.F., Paris, pp. 586-587.





Summary : **In search of the Iberian Chiffchaff.**

A prospection in the french Pays-Basque from 1-6 May 2001 in areas where the Iberian Chiffchaff *Phylloscopus brehmii* reputedly occurs, resulted in the discovery of 2 isolated singing birds only. Is the species rarer in certain years, or has its abundance been overestimated ?

Resumen : **A la búsqueda del Mosquitero ibérico.**

Una prospección realizada en el País Vasco francés del 1 al 6 de Mayo del 2001, en lugares reputados por la presencia del Mosquitero ibérico *Phylloscopus brehmii*, permitió descubrir solamente dos cantores aislados. ¿ La especie es más rara ciertos años o bien su abundancia ha sido sobreestimada ?

Éric Lalous, Route des Brossillots, 72300 PRÉCIGNÉ

Note de la rédaction : *divers travaux de Marc Salomon ont permis de préciser le statut taxonomique et la répartition exacte de l'espèce en Pays-Basque français. On consultera notamment l'article suivant, fruit d'une minutieuse étude de terrain : « Analyse d'une zone de contact entre deux formes parapatriques : le cas des Pouillots véloces P. c. collybita et P. c. brehmii ». Revue d'Ecologie (Terre et Vie), 42 (1987) : 377-420. Cependant, une actualisation de la répartition de l'espèce paraît nécessaire car certaines observations nous font penser à des modifications depuis les années 1980.*