


D'OSS

Revue
du **GOPA**
Groupe
Ornithologique
des Pyrénées
et de l'Adour

vol. 3, n° 1 Avril 2003



Robert Hainard

LE CASSEUR

Notes d'Ornithologie Pyrénéenne : Novembre 2001 à Octobre 2002

Le Crave à bec rouge en haute vallée d'Ossau

Suivi des Laridés bagués couleur sur le littoral landais

Notes diverses : Grand Cormoran, Linotte à bec jaune, Pic mar, etc.
Bibliographie passionnelle



Observation exceptionnelle de deux Linottes à bec jaune *Carduelis flavirostris* sur le littoral landais


Andréas GUYOT

La Linotte à bec jaune est un hivernant rare en France, principalement dans le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, la Normandie jusqu'au Mont-Saint-Michel (Yeatman-Berthelot, 1991). Son observation ailleurs est tout à fait exceptionnelle.

Le 6 novembre 2002, la lecture des bagues de Mouettes mélanocéphales *Larus melanocephalus* à Hossegor s'avérant peu productive, je quittai ce site pour la station d'épuration de Capbreton.

Sur un couloir de passage très important pour les passereaux migrateurs, entre l'Océan et la forêt landaise, la dune avec sa friche herbacée attire beaucoup de pipits, bruants, alouettes, pinsons, serins, linottes, etc. Sur cette zone la station d'épuration dépose ses boues sèches, si bien qu'il y pousse jusqu'à des tomates, citrouilles...

À cette période de l'année, nous y avons observé un Bruant des neiges *Plectrophenax nivalis* le 1/11/1999 et un Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus* tardif le 11/11/2000.



Ce 6 novembre, je fus attiré par des passereaux se nourrissant au sol sur une zone de terre noirâtre et que je distinguais au travers des graminées. Grâce à la longue-vue je reconnus deux Linottes à bec jaune. Ces oiseaux, striés de brun sur fond chamois-beige, avec un petit bec jaune, une gorge unie, une barre alaire marquée, les côtés des rectrices blancs comme la base du ventre, étaient conformes à la description qu'en donnent Svenson *et al.* (1999). J'avais déjà observé l'espèce à Grand-Fort-Philippe (Pas-de-Calais) le 23/12/1999.

Les deux linottes s'envolèrent bientôt, accompagnées par un groupe d'environ dix oiseaux que je ne pus reconnaître au vol ; s'agissait-il également de Linottes à bec jaune ?

Il s'agit là de la première observation connue de cette espèce sur le littoral lan-

Observation exceptionnelle de deux Linottes à bec jaune *Carduelis flavirostris* sur le littoral landais - Andréas Guyot

dais et de la deuxième pour le bassin de l'Adour, un individu ayant été capturé à Biarritz (64) le 2 février 1962, à une époque où la Linotte à bec jaune était plus commune en France (Dubois *et al.*, 2000).

Bibliographie

DUBOIS P.J., LE MARÉCHAL P., OLIOSO G, YÉSOU P., 2000. *Inventaire des oiseaux de France*. Nathan, Paris, pp. 351-352.

SVENSSON L., MULLARNEY K., ZETTERSTRÖM D., GRANT P.J., 1999. *Le Guide ornitho*. Delachaux & Niestlé, Paris.

YEATMAN-BERTHELOT D., 1991. *Atlas des Oiseaux de France en Hiver*. S.O.F., Paris, 575 p.

Summary : An exceptional record of two Twites *Carduelis flavirostris* on the coast of the department of the Landes.

On 6 November 2002, two Twites were seen at the water treatment plant at Capbreton (Landes), on the coast. This is the first record for the species in this department, and the second for the Adour basin.

Resumen : Observación excepcional de dos Pardillos piquigualdos *Carduelis flavirostris* en el litoral landés.

Dos Pardillos piquigualdos fueron observados el 6 de noviembre del 2002 en la estación de depuración de Capbreton (Landas), al borde del mar. Se trata de la primera observación de la especie en esta provincia, y de la segunda en la cuenca del Adour.

Andréas Guyot, 7 rue Jules Verne, 64000 PAU