


D'OS

Revue
du **GOPA**
Groupe
Ornithologique
des Pyrénées
et de l'Adour

vol. 3, n° 2 Octobre 2003



Robert Hainard

LE CASSEUR

Liste commentée des reptiles et amphibiens des Pyrénées occidentales

Caractérisation de l'avifaune nicheuse des Pyrénées occidentales

Le Gypaète pourrait-il rattraper l'os qu'il a lâché ?

Statut du Vautour moine dans les Pyrénées occidentales

Notes diverses : Rollier, Labbe à longue queue, Fauvette mélanocéphale,
Elanion, Circaète, Faucon crécerelle, Loirs

Bibliographie passionnelle

Observation d'un Labbe à longue queue *Stercorarius longicaudus* en vallée de Campan, Hautes-Pyrénées

Christophe BERGES

RESUME : Du 31 août au 13 septembre 2002, un Labbe à longue queue *Stercorarius longicaudus* a séjourné en Vallée de Campan, à 725 mètres d'altitude. Il s'agit de la seconde donnée pour le département des Hautes Pyrénées, confirmant l'existence d'une voie de migration pour cette espèce, bien à l'intérieur des terres.

Le Labbe à longue queue a la réputation d'être l'espèce de labbe la plus rare sur les mers de nos contrées. C'est aussi un oiseau qui s'observe ponctuellement mais régulièrement dans les terres. Pour le sud-ouest, quelques mentions concernent des départements proches comme les Pyrénées-Atlantiques ou la Haute-Garonne avec de 1 à 2 observations (Dubois & al, 2000), aucune dans les Hautes-Pyrénées. Il existe pourtant au moins une donnée antérieure concernant le Lac de Puydarrieux, avec 2 oiseaux le 23 avril 1988 par Pierre Dalous (base de données des Hautes-Pyrénées). Cette donnée n'a pas été proposée au Comité d'Homologation National.


Circonstances de l'observation

Le lundi 9 septembre 2002, une collègue de bureau, Sandra Cassan, m'informe de la présence d'un oiseau marin dans son quartier de Galade, en vallée de Campan, présent depuis une semaine et qui, je cite : « ressemble à un Labbe ». Sceptique mais intrigué, je décide d'aller en sa compagnie à la recherche de cet oiseau mystérieux qui « se nourrit de vers de terre ». Après une demi heure, nous retrouvons l'oiseau qui a changé de parcelle. Il s'est installé dans un prairie récemment fauchée en bord de la D 935, près d'une habitation. A ma grande surprise, il s'agit bien d'un labbe et il se nourrit bien de vers de terre !

Description

L'oiseau, posé, ressemble à un gros pigeon, d'un ton uniforme grisâtre à marron. Sa silhouette est élancée, la tête et la poitrine bien rondes et l'arrière très effilé. La multitude de petits liserés clairs au bout des plumes montre que nous sommes en présence d'un jeune de l'année. Son bec assez petit est bicolore, gris-bleuté à la base et terminé par une pointe noire plus épaisse. Ses pattes sont bleutées, virant au rose sous la palmure et terminées de noir. Les caractères principaux qui attirent mon attention sont les sous caudales très contrastées noires et blanches, et surtout les rémiges non tachées de clair à l'extrémité. Ces critères sont d'autant plus nets que l'oiseau se laisse approcher à 2 m. La queue semble se terminer par une tâche plus claire. L'oiseau se laisse peu observer en vol, mais les rémiges secondaires apparaissent plus sombres que les couvertures. Il ne m'a pas été possible d'observer les critères relatifs à la coloration de la base des rémiges primaires, mais l'ensemble du plumage, silhouette et coloration, les 2 critères des sous caudales et de l'extrémité des rémiges primaires confirment que l'espèce en présence est bien un Labbe à longue queue.

Observation d'un Labbe à longue queue en vallée de Campan - C. Bergès



Comportement et présence

L'oiseau ne décolle quasiment jamais, la présence humaine ne le dérange pas puisqu'il se laisse approcher à 2 m et fuit seulement au dernier moment en marchant (Il s'est laissé à l'occasion photographier de très près). Il passe toutes ses journées à tirer des lombrics du sol et à s'en nourrir. Le soir entre 18 et 19h il se couche à même le sol, toujours dans cette prairie. Bien que volant, il ne décolle qu'au dernier moment, à l'arrivée d'un chien par exemple. Observé dès le samedi 31 août (témoignage d'un voisin) il est resté dans le jardin de sa maison pendant une semaine, avant de s'installer dans cette parcelle de bord de route. Je l'y ai ensuite observé tous les jours à partir du 9 septembre, encore observé le jeudi 12 au soir (Sandra Cassan, comm. orale) il semble avoir quitté le site le vendredi 13 au matin (non revu dans l'après-midi).

Conclusion

Une observation d'un oiseau marin rare due au plus grand des hasards, comme on doit en rater tant d'autres ; une halte d'un oiseau plutôt pélagique en moyenne montagne (725 m d'alt.) dans le fond de la vallée de Campan ; l'observation d'une espèce à tendance piscivore en hiver (kleptoparasitisme) se nourrissant de vers de terre : autant de facteurs surprenants qui montrent que l'ornithologie réserve sans cesse des surprises à ses praticiens. Pourtant rien d'extraordinaire dans cette observation, les juvéniles de l'espèce sont régulièrement mentionnés dans les terres, et notamment début septembre, ce qui correspond au pic d'erratisme des jeunes labbes à longue queue (Dubois & al, 2000) ; de plus c'est un oiseau qui élève ses jeunes dans les terres, en pleine toundra et dont le régime alimentaire est alors composé de micro-mammifères... Une perturbation d'Ouest un peu plus forte que d'habitude aura sans doute entraîné et contraint ce Labbe épuisé à se poser pour reprendre des forces. Cet oiseau qui sera resté 15 jours dans un décor montagnard inhabituel, nous montre qu'il faut toujours être très attentif et qu'en ornithologie rien n'est impossible.

Summary : From 31 August to 13 September 2002, a juvenile Long-tailed Skua *Stercorarius longicaudus* was in the Campan valley (Hautes Pyrénées) at 725 metres altitude. This is the second record of this species for the department which is well inland, confirming the existence of a passage far from the Atlantic coast.

Resumen: Del 31 de agosto al 13 de septiembre del 2002, un Pagalo rabero *Stercorarius longicaudus* permaneció en el valle de Campan (Altos Pirineos) a 725 metros de altitud. Se trata de la segunda observación de esta especie en el departamento, que se sitúa en el interior de las tierras, confirmando la existencia de una vía de paso lejos de la costa atlántica.

Bibliographie

- BEAMAN M. & MADGE S., 1998. *Guide encyclopédique des oiseaux du Paléarctique occidental*, Nathan, Paris, p. 390, 391 et 414
- DUBOIS P., LE MARECHAL P. & al, 2000. *Inventaire des oiseaux de France – avifaune de France métropolitaine*, Nathan, p.182-183
- HARRIS A., TUCKER L., VINICOMBE K., 1992. *Identifier les Oiseaux – comment éviter les confusions*, Delachaux et Niestlé, Lausanne, p.98-104
- MULLARNEY K., SVENSSON L. & al., 1999. *Le Guide ornitho*, Delachaux et Niestlé, Lausanne, p.166-167.

Christophe Bergès
Cité La Passerelle
65200 Bagnères de Bigorre