

D'O.S

Revue
du **GOPA**
Groupe
Ornithologique
des Pyrénées
et de l'Adour

vol. 4, n° 1 Avril 2004



Robert Hainard

LE CASSEUR

Notes d'Ornithologie Pyrénéenne : novembre 2002 à octobre 2003

La vision du Circaète en vol stationnaire

Aperçu des programmes de baguage colorés :
Mouettes rieuse et mélanocéphale

Aigle ibérique, Faucon kobez, Bécasseaux falcinelle et tacheté
Chevalier à pattes jaunes, Guifette leucoptère, Pipit à gorge rousse
Desman des Pyrénées, Gypaètes au bain

Bibliographie passionnelle

Première observation d'un Bécasseau falcinelle *Limicola falcinellus* dans les Pyrénées-Atlantiques, sur le lac de l'Ayguelongue.

Andréas GUYOT

Le Bécasseau falcinelle *Limicola falcinellus* fait partie des migrateurs rares dans notre pays. Bien qu'il s'observe chaque année en France, aux dates moyennes du 13 mai et du 25 août lors de ses migrations (Dubois & Yésou, 1992), il est peu fréquent sur le littoral atlantique et plus rare encore à l'intérieur des terres.

En Aquitaine, son observation est très rare. J'avais vu celui du 10/05/87 à Certes (Gironde) ; il y eut ensuite une autre mention le 11/04/96 au Teich (Dubois *et al.*, 2000) et enfin la première observation dans le Bassin de l'Adour par J.L. Grangé à Orx le 14/05/92 (Grangé, 2002).

Pour la France, hormis la Camargue (57 observations) où des petits groupes ont été observés, il s'agit surtout d'oiseaux isolés (Dubois *et al.*, *op. cit.*).

Il se reproduit en Fennoscandie, de la Norvège au nord-ouest de la Russie, au cœur des grandes tourbières non boisées et il hiverne en Afrique de l'Est où il fréquente les vasières à marée basse, notamment les zones de boue humide.



Le lac de l'Ayguelongue (dit de Momas, commune du lieu) est un lac collinaire servant à l'irrigation du maïs ; la baisse du niveau de l'eau y laisse de grandes vasières.

Ainsi, le 16 août 2003, lors d'une visite pour compter les limicoles, j'eus la surprise d'observer un Bécasseau falcinelle.

La veille après 6 heures d'observation je n'avais pas vu l'oiseau ; il est donc vraisemblable que sa date d'arrivée soit bien le 16/08, cela nous semble important, puisque chaque jour jusqu'au 22/08 nous l'avons observé dans le même milieu, soit 8 journées. Le Bécasseau à queue pointue *Calidris acuminata* observé dans le même milieu y avait séjourné 10 jours mais nous n'étions pas sûrs de sa date d'arrivée (Guyot, 2002).

Son identification fut facile. Au premier coup d'œil je reconnus immédiatement l'oiseau et, ayant toujours un guide avec moi, il nous fut facile avec M. Spring, M. C. Bodon, S. Carbonnaux et C. Guinchan de mettre un nom sur cette rareté. Il s'agit de la seule mention automnale de l'espèce en Aquitaine.



Description de l'oiseau

Parties nues : pattes gris-verdâtre ; long bec épais à la base et courbe à la pointe.

Silhouette et taille : plus petit que le Bécasseau variable *C. alpina*, long et fin, l'oiseau en mouvement faisait penser à une Bécassine sourde *Lymnocyrtes minimus*. Il frappe par son contraste entre



le dos et le ventre, surtout en vol, le dessus paraissant noir. Les primaires arrivent au niveau des rectrices.

Tête : 4 sourcils très nets et blancs sur l'occiput, au centre un trait noir descendant jusqu'à la base du bec ; le sourcil blanc au-dessus de l'œil forme un accent circonflexe. Les lores sont sombres ainsi que les parotiques. La base de la joue est blanche jusqu'à la base de la mandibule inférieure.


Corps : plumes du dos noires à rousse marron frangées de blanc, ce qui dessine une barre alaire sur le

côté. Les liserés clairs laissent croire à un Y sur le dos et un grand V au-dessous ; le côté du corps en avant des scapulaires était teinté de crème-jaunâtre, les flancs blanc plus sale vers la poitrine. Le collier, marqué, est assez nettement grisâtre. La région scapulaire longue et étroite accentue la finesse de l'oiseau. Les tertiaires sont rousses ainsi que les scapulaires supérieures. Le côté des rectrices est pâle avec au centre un filet noir.

Voix : nous avons entendu longtemps l'oiseau crier, surtout le 22/08. C'est un sifflet très rapide de même longueur que le Bécasseau variable (et plus long aussi qu'un Bécasseau de Temminck *C. temminckii* qui cria en même temps).

Discussion

Le lac de Momas se révèle être un lieu de premier ordre pour l'observation des petits et grands échassiers dans les Pyrénées-Atlantiques puisque du 16 au 22 août, nous avons observé 8 cigognes noires *Ciconia nigra* posées et 3 cigognes blanches *C. ciconia* posées, 2 échasses blanches *Himantopus himantopus*, 3 oedicnèmes criards *Burhinus oedicnemus*, 10 petits gravelots *Charadrius dubius* dont 2 couples avec respectivement 2 et 3 jeunes, 5 grands gravelots *C. hiaticula*, 1 Gravelot à collier interrompu *C. alexandrinus*, 50 vanneaux huppés *Vanellus vanellus*, 4 bécasseaux minutes *C. minuta*, 1 Bécasseau de Temminck, 3 bécasseaux variables, 10 combattants variés *Philomachus pugnax*, 25 bécassines des marais *Gallinago gallinago*, 10 barges à queue noire *Limosa limosa*, 3 chevaliers arlequins *Tringa erythropus*, 2 chevaliers gambettes



Première observation d'un Bécasseau falcinelle *Limicola falcinellus* - A. Guyot

T. totanus, 7 chevaliers aboyeurs *T. nebularia*, 5 chevaliers culblancs *T. ochropus*, 15 chevaliers sylvains *T. glareola* et 20 chevaliers guignettes *Actitis hypoleucos*. Au plus fort du passage, nous avons ainsi observé jusqu'à 40 espèces en une journée. De tels chiffres ne sont pas exceptionnels, j'y ai moi-même vu 210 espèces en 6 années d'existence du lac.

La situation géographique du site (qui dégage de grandes vasières en été) sur un large plateau avant le piémont est certainement un atout. De plus, un suivi quotidien a eu lieu sur ce lac au cours de l'automne 2003. Ceux qui ont la possibilité de lire régulièrement les « Notes d'Ornithologie Pyrénéenne » de J.L. Grangé et S. Duchateau pourront découvrir la richesse du site.

Summary : A Broad-billed Sandpiper *Limicola falcinellus* was recorded on the Ayguelongue reservoir (Momas, Pyrénées-Atlantiques) from 16th to 22nd August 2003, this being the second record for the Adour Basin. The dates of the record correspond to the peak of records at a national level (second half of August).

Resumen : Un Correlimos falcinelo *Limicola falcinellus* pasó una temporada en el pantano del Ayguelongue (Momas, Pyrénées-Atlantiques) del 16 al 22 de agosto de 2003, constituyendo el segundo dato para la Cuenca del Adour. Las fechas de observación corresponden a la temporada con mayor cantidad de datos en el territorio nacional (segunda quincena de agosto).

Remerciements

Je remercie tous les membres du GOPA (64 et 65) pour être venus confirmer mon observation, ainsi que le photographe Jérôme Fouert-Pouret.

Bibliographie

BEAMAN M. & MADGE S., 1998. *Guide encyclopédique des oiseaux du Paléarctique occidental*. Nathan, Paris. 872 p.

DUBOIS P.J. & YÉSOU P., 1992. *Les oiseaux rares en France*. Éditions Chabaud, Bayonne. 366 p.

DUBOIS P.J., LE MARÉCHAL P., OLIOSO G. & YÉSOU P., 2000. *Inventaire des oiseaux de France. Avifaune de France métropolitaine*. Nathan, Paris. 397 p.

GRANGE J.L., 2002. Liste commentée des oiseaux des Pyrénées occidentales et du sud des Landes. *Le Casseur d'os*, 2 (2) : 84-132.

GUYOT A., 2002. Première observation d'un Bécasseau à queue pointue *Calidris acuminata* en Aquitaine sur le lac de l'Ayguelongue. *Le Casseur d'os*, 2 (1) : 58-59.

Andréas Guyot
7, rue Jules Verne
64000 PAU