

D'O.S

Revue
du **GOPA**
Groupe
Ornithologique
des Pyrénées
et de l'Adour

vol. 4, n° 1 Avril 2004



Robert Hainard

LE CASSEUR

Notes d'Ornithologie Pyrénéenne : novembre 2002 à octobre 2003

La vision du Circaète en vol stationnaire

Aperçu des programmes de baguage colorés :
Mouettes rieuse et mélanocéphale

Aigle ibérique, Faucon kobez, Bécasseaux falcinelle et tacheté
Chevalier à pattes jaunes, Guifette leucoptère, Pipit à gorge rousse
Desman des Pyrénées, Gypaètes au bain

Bibliographie passionnelle

Première observation d'un limicole nord-américain, le Bécasseau tacheté *Calidris melanotos*, dans le Bassin de l'Adour sur le lac de l'Ayguelongue

Andréas GUYOT

Le Bécasseau tacheté est le limicole nord-américain le plus observé dans le Paléarctique occidental, à tel point que les Anglais dans leur guide *The shell guide to the birds* le classent parmi les oiseaux réguliers (Ferguson *et al.*, 1983).

En France, pour le XX^{ème} siècle, tout commence le 18 septembre 1935 dans l'Orne puis à Ouessant le 21 septembre où l'oiseau sera bagué. Depuis les années 70 et le développement de l'ornithologie moderne, il est observé chaque année dans le Finistère avec 45% des mentions françaises pour ce seul département, la façade atlantique en totalisant par ailleurs 70%. La date moyenne des observations est le 23 septembre (Dubois *et al.*, 2000).

J'ai découvert l'oiseau sur le lac de l'Ayguelongue, commune de Momas, le 25 septembre 2003. Cela n'a donc rien d'exceptionnel, il fallait bien que notre région soit visitée un jour ou l'autre puisque la Gironde l'avait été (Dubois & Yésou, 1992 ; Dubois *et al.*, *op. cit.*), mais aussi la réserve de Plaiaundi (Irún) sur la partie espagnole de la baie de Chingoudy : 1 ind. le 07/10/98 (1^{re} obs. en Gipuzkoa), 2 ind. le 12/10/98 (Gorospe Rombouts, 2000), 2 ind. les 26 et 27/05/2000 puis 1 ind. le 29/05/2000 (Gorospe Rombouts, 2001) (voir Dubois & Yesou, *op. cit.* et Dubois *et al.*, *op. cit.* pour comprendre l'origine des observations printanières).

Sur la façade atlantique des Monts Cantabriques, le « Correlimos pectoral » a été observé 4 fois dans les Asturies (Galarza, 1989), et une fois dans la ría de Gernika, première observation pour la Biscaye en 1987.

Seules les Landes n'ont pas encore d'observation du Bécasseau tacheté ; le site du marais de la Pipe à Léon, juste derrière la dune, pourrait bien accueillir ce futur visiteur à condition que la pression d'observation soit importante (avis aux amateurs).

La localisation des données françaises indique une origine transatlantique des oiseaux, les adultes migrant les premiers, les juvéniles ensuite. Aux mêmes dates, en comparaison des observations anglaises (Dymond *et al.*, 1989), nous avons principalement des juvéniles, donc là encore rien d'exceptionnel. Je dis cela en pensant à l'observation du Bécasseau à queue pointue *Calidris acuminata* qui, elle, était bien exceptionnelle (Guyot, 2002).

Description de l'oiseau

Parties nues : pattes jaune-verdâtre au soleil, paraissant grises à l'ombre ; petit bec guère plus long que la tête, légèrement courbé et plus clair à la base, la nuance de clair étant elle aussi relative à l'éclairage.

Silhouette et taille : plus grand que le Bécasseau variable *C. alpina*, il n'a rien à voir avec un combattant (« jizz » *calidris*). Le cou est long lorsque l'oiseau se tient droit ou se nourrit : cela lui donne certes une allure particulière mais il s'agit bien d'un *look* bécasseau, élané et nerveux.

Tête : elle est petite, cela frappe au premier coup d'œil. Lores noirs, sourcil jaunâtre mal défini derrière l'œil (là encore le soleil peut donner une impression de blancheur). La calotte est foncée. Pas



de cercle orbital visible, juste une esquisse (mais vu à l'ombre par temps gris). Vu de face le dessin de la tête, toutes proportions gardées, aurait un air de Courlis corlieu *Numenius phaeopus*.

Corps : les stries de la poitrine s'arrêtent net au début du ventre, c'est « le critère » du Tacheté. Les plumes du dos sont frangées de clair ce qui donne une allure Minute. Il y a deux barres bien nettes sur le haut du dos puis deux autres plus diffuses sur les cotés ; au centre du dos des plumes noires, entre les deux barres des plumes avec du roux et sous la deuxième barre des plumes noires. L'arrière de l'oiseau est long, les rémiges primaires atteignent les rectrices, donnant une silhouette élancée et svelte. Le ventre est blanc.

En vol : il est vrai qu'il ressemble au Combattant, mais ce serait la seule comparaison. Les sus-caudales sont noires au centre avec deux parties blanches sur les cotés. Les longues ailes montrent une légère barre alaire et, surtout, le vol est irrégulier, haché.

Age : juvénile ; l'aspect très écailleux des parties supérieures dû aux franges claires des plumes est caractéristique des jeunes oiseaux.

Voix : je l'ai entendu deux fois en vol (surtout à l'envol). Je n'avais jamais entendu ce type de cris « truk! trek!... » assez sourd.

Comportement : nous avons tous été frappés par sa vélocité, avec des *sprints* de Bécasseau sanderling *C. alba*. Il bouge sans cesse et rapidement de gauche à droite en quête de nourriture ! Etait-il affamé après un si long voyage ? (P. Géroutet en 1982 avait vu un oiseau flegmatique à Ouessant).

Discussion

Il aura donc fallu attendre 2003 pour observer dans le Bassin de l'Adour le limicole néarctique le plus régulier en France : cela correspond à un afflux inhabituel de l'espèce dans notre pays avec 31 individus signalés cet automne (contre 12 en 2002) (Legrand P.A., 2004). Celui présent sur le lac de l'Ayguelongue y aura séjourné du 25 septembre au 02 octobre 2003.

J'ai prouvé que nos sites pouvaient aussi être remarquables en septembre : 2 Bécasseaux de Temminck *C. temminckii*, 1 Bécasseau falcinelle *Limicola falcinellus*, 1 Guifette leucoptère *Chlidonias leucopterus* et 1 Bécasseau tacheté pour Momas en 2003.

En fait j'ai appliqué une pression d'observation constante, c'est-à-dire tous les jours sur le terrain, quel que soit le temps, surtout au moment des dépressions. Voilà le résultat ; alors le lac de l'Ayguelongue est-il un bon site ?

Il est certes situé dans une large vallée à fond plat mais ce n'est pas tout ; pour devenir bon, un site doit être visité chaque jour et tous les sites, vos sites préférés, peuvent devenir de bons lieux d'observation.

Seule une pression d'observation à l'image de celle pratiquée en Angleterre (Dymond *et al.*, *op. cit.*) (et voir l'article "Limicoles nord-américains" de Dubois & Yésou, *op. cit.*) nous permettra de découvrir d'autres limicoles néarctiques dans le Bassin de l'Adour.

Summary : A Pectoral Sandpiper *Calidris melanotos* was recorded on the Ayguelongue reservoir (Momas, Pyrénées-Atlantiques) from 25th September to 2nd October 2003. This is the first record for the species on the Adour Basin. This record is discussed in relation to the national context and underlines the importance of the Atlantic coast for this north American wader.

Resumen : Un Correlimos pectoral *Calidris melanotos* permaneció en el Lago del Ayguelongue (Momas, Pyrénées-Atlantiques) del 25 de septiembre al 2 de octubre de 2003, aportando así la primera cita de la espe-

cie en la Cuenca del Adour. Esta observación es colocada en un contexto nacional que subraya la importancia de la fachada atlántica para este limícola norteamericano.

Remerciements

Je remercie encore les observateurs du GOPA nombreux à s'être déplacés pour venir m'aider à confirmer cette observation.

Bibliographie

Je commence cette bibliographie par Paul Géroutet dont le livre est malheureusement épuisé :

GEROUDET P., 1982. *Limicoles, Gangas et Pigeons d'Europe*. Tome 1. Delachaux et Niestlé, Neuchâtel. 240 p. (Le Bécasseau tacheté dont il parle est une de ses observations à Ouessant, à lire...)

BEAMAN M. & MADGE S., 1998. *Guide encyclopédique des oiseaux du Paléarctique occidental*. Nathan, Paris. 872 p.

DUBOIS P.J. & YESOU P., 1992. *Les oiseaux rares en France*. Éditions Chabaud, Bayonne. 366 p.

DUBOIS P.J., LE MARÉCHAL P., OLIOSO G. & YESOU P., 2000. *Inventaire des oiseaux de France. Avifaune de France métropolitaine*. Nathan, Paris. 397 p.

DYMOND J.N., FRASER P.A. & GANTLETT S.J.M., 1989. *Rare birds in Britain and Ireland*. T & A D Poyser Ltd, Calton.

FERGUSON-LEES J., WILLIS I. & SHARROCK JTR., 1983. *The shell guide to the birds of Britain and Ireland*. Michaël Joseph Limited, London.

GALARZA A., 1989. *Urdaibai, Avifauna de la ria de Gernika*. Diputación floral de Bizkaia, Bilbao.

GOROSPE ROMBOUS G., 2000. *Antxeta, Anuario ornitologico de Gipuzkoa, vol. 9, 1998*. Itsas Enara Ornitologi Elkarte. Donostia.

GOROSPE ROMBOUS G., 2001. *Antxeta, Anuario ornitologico de Gipuzkoa, vol. 10, 1999-2000*. Itsas Enara Ornitologi Elkarte. Donostia.

GUYOT A., 2002. Première observation d'un Bécasseau à queue pointue *Calidris acuminata* en Aquitaine sur le lac de l'Ayguelongue. *Le Casseur d'os*, 2 (1) : 58-59.

LEGRAND P.A., 2004. Le coin des branchés. *L'Oiseau Magazine*, 73 : 70-71.

Andréas Guyot
7, rue Jules Verne
64000 PAU