

D'OIS

Revue
du **GOPA**
Groupe
Ornithologique
des Pyrénées
et de l'Adour

vol. 4, n° 2 Octobre 2004



Robert Hainard

LE CASSEUR

Notes d'Ornithologie Pyrénéenne : novembre 2003 à octobre 2004

Le Pic mar dans les Pyrénées occidentales

Hivernage du Milan royal dans le piémont pyrénéen en 2002-2004

Comptes rendus : suivis 2004 Élanion blanc et Aigle royal

Contributions pour l'Ours brun

Varia : Fauvette mélanocéphale, Bruant à calotte blanche,
Chevalier bargette, Gypaète barbu

Bibliographie passionnelle



Un Bruant à calotte blanche *Emberiza leucocephalos* dans la vallée de l'Arros (Hautes-Pyrénées)

François BALLEREAU

La sous-espèce nominale de ce Bruant *Emberiza l. leucocephalos* se reproduit dans l'est de la Russie et dans toute la Sibérie non boréale. Il est proche du Bruant jaune *E. citrinella* avec lequel il s'hybride régulièrement. La majeure partie des oiseaux hiverne dans le sud et le centre de l'Asie.

En Europe de l'ouest, il est signalé depuis longtemps comme hivernant rare mais régulier dans le nord de l'Italie (150 observations pour au moins 300 individus) et découvert récemment en Toscane avec une population hivernante de 45-50 individus (Occhiato, 2003). Il est régulier en migration et hivernage en Israël, accidentel dans le reste de l'Europe. En France, sa présence est mise à jour dans les années 1960 en Camargue, lors des campagnes de baguage de passereaux, en petit nombre toutefois. La France compte une vingtaine d'observations de ce passereau au XX^e siècle, pour la plupart dans le Sud-Est et notamment en Camargue (Dubois *et al.*, 2000). La seule donnée connue du Sud-Ouest provient d'un oiseau capturé dans les Landes en septembre 1913 (Grangé, 2002).

Le matin du 25 mars 2004, alors que j'observe une petite troupe de bruants jaunes présente depuis au moins le milieu de l'hiver (mi-janvier) sur le coteau en bordure du village, je découvre après quelques minutes d'observation (à une vingtaine de mètres) un bruant qui détonne avec les oiseaux qui l'entourent. Il n'arbore aucune teinte jaune, ses flancs et sa poitrine sont roux rosé comme flammés, il porte une petite bavette blanche, sa tête est entièrement marron acajou à l'exception d'une large bande blanche sous l'œil et du blanc impur ou moucheté sur le sommet du crâne ; le manteau et la queue sont identiques à ceux du Bruant jaune. À l'examen de ces critères, l'identification de ce Bruant à calotte blanche en plumage nuptial ne fait aucun doute.

Cette observation a lieu dans la vallée de l'Arros sur la commune de Clarac, à une altitude de 350 m. Le milieu ouvert est composé de prairies naturelles pâturées par des chevaux et des bovins, une friche forestière d'environ un hectare (avec des houx, ronciers, herbacées et jeunes arbres) et des bosquets de chênes pédonculés et trembles. La présence de chevaux semble prépondérante car les bruants passent l'essentiel de leur temps de gagnage dans les parcelles occupées par ces animaux. Ils se perchent en soirée dans les fourrés de houx et dans les arbres isolés avant de dormir dans la friche avoisinante.

L'espèce la plus commune dans ce contexte est le Bruant jaune avec une soixantaine d'individus, le Bruant zizi *Emberiza cirlus*, une vingtaine d'oiseaux et le Bruant à calotte blanche, un seul individu malgré une recherche assidue par plusieurs observateurs.

Le comportement de ce dernier ne diffère pas de celui des autres bruants jaunes, y compris pour le chant et les cris : en effet le « calotte blanche » est observé chantant au sommet d'un chêne le 28 mars en matinée.

L'oiseau sera observé une dernière fois ce même jour en fin d'après-midi et ce malgré une forte pression d'observation les jours suivants. Son départ correspond chronologiquement à la désert-

tion du site par les bruants jaunes, après un probable hivernage dans le sud-ouest de la France.

Summary: A Pine Bunting *Emberiza leucocephalos* was present in the Bigorre from 25 to 28 March, 2004. This is the second record for the south-west of France. The species is classed as an occasional wintering species in France.

Resumen : Un Escribano de Gmelin *Emberiza leucocephalos* permaneció en Bigorre del 25 al 28 de marzo del 2004. Este dato es el segundo para el suroeste de Francia, teniendo la especie un estatus de invernante ocasional en Francia.

Bibliographie

DUBOIS P. J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P., 2000. *Inventaire des oiseaux de France. Avifaune de France métropolitaine*. Nathan, Paris. 397 p.

GRANGE J.-L., 2002. Liste commentée des oiseaux des Pyrénées occidentales et du sud des Landes. *Le Casseur d'os*, 2 (2) : 84-132.

OCCHIATO D., 2003. Identification of Pine Bunting *Emberiza leucocephalos*. *Dutch Birding* 25 (1): 1-16.

François Ballèreau
Le presbytère
65190 Clarac



Clarac (Photo A. Nerrière)